



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura  
Alessandria




CIA Alessandria


## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

**BOLLETTINO N° 08**  
**29/05/2024**

### ANDAMENTO METEOROLOGICO




**74MM**



**75  
MM**





Coldiretti Alessandria



Confagricoltura  
Alessandria



CIA Alessandria





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### MONILIA

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI, SI CONSIGLIA INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI :

**CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH A 0,6 Kg/HA)**

OPPURE

**CYPRODINIL (CHORUS)**

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

**\*TEBUCONAZOLO (FOLICUR)**

**\*DIFENOCONAZOLO (SCORE)**

**\*MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVISION) (AL MASSIMO DUE INTERVENTI) (\*HANNO ANCHE AZIONE ANTI-OIDICA)**

(AL MASSIMO DUE INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE TRA TEBUCONAZOLO E DIFENOCONAZOLO)

(I FUNGICIDI IBE NON SONO IMPIEGABILI PIÙ DI QUATTRO VOLTE ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

### OIDIO

NEI FRUTTETI A RISCHIO DI INFEZIONE E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI ANTOIDICI SPECIFICI A BASE DI:

**ZOLFO**

**BUPIRIMATE (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**

### AFIDI

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**FLONICAMID (TEPPEKI)(MAX 1 INT/ANNO)**

**ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO**

**SPIROTETRAMAT(MOVENTO)(MASSIMO DUE TRATTAMENTI)**

**SULFOXAFLOX (CLOSER) IMPIEGABILE ENTRO IL 28 GIUGNO A SEGUITO DI DECRETO DI AUTORIZZAZIONE PER EMERGENZA FITOSANITARIA (UN INTERVENTO/ANNO)**



Coldiretti Alessandria



**Confagricoltura**  
Alessandria



CIA Alessandria

## **SUSINO** (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### **MONILIA**

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI, SI CONSIGLIA INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI :

**DIFENOCONAZOLO (SCORE)**

**TEBUCONAZOLO (FOLICUR)** (COMPLESSIVAMENTE MASSIMO 2 INTERVENTI)

**MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVISION)** (MASSIMO DUE INTERVENTI) (I FUNGICIDI IBE NON SONO IMPIEGABILI PIÙ DI QUATTRO VOLTE ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

OPPURE

**TRIFLOXYSTROBIN (FLINT MAX)** o **PYRACLOSTROBIN** (MAX 2 INTERVENTI COMPLESSIVI)

**FLUDIOXINIL+CYPRODINIL (SWITCH)** o **CYPRODINIL (CHORUS)** (MASSIMO 1 INTERVENTO)

**BICARBONATO DI POTASSIO** (IMPIEGABILE ANCHE IN BIO)

## **ALBICOCCO** (MATURAZIONE)

---

### **MONILIA**

PER LE VARIETÀ PROSSIME ALLA RACCOLTA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**TEBUCONAZOLO (FOLICUR)** T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)  
(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)

**FENEXAMIDE (TELDOR)** T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

**TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO** T.C. 7 GG. (FLINT MAX)  
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

**MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVYSION)** T.C. 3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

**PENTHIOPYRAD (FONTELIS)** T.C. 3 GG.

(MASSIMO 1 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

**CYPRODINIL+FLUDIOXONIL**

**CYPRODINIL (CHORUS)**

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

**PRESTARE ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA**



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## CILIEGIO (INVAIATURA-MATURAZIONE)

---

### MONILIA

PER LE VARIETÀ PROSSIME ALLA RACCOLTA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVYSION) T.C.3 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)**

**TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)  
(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)**

**FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**

**TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)  
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**

**PRESTARE ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA**

### MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN **FASE DI INVAIATURA** (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

**ETOFENPROX\* (TREBON, SWORD UP) T.C. 3 GG.**

**ACETAMIPRID\* (EPIK) T.C. 14 GG \*EFFICACI ANCHE CONTRO *DROSOPHILA***

**SPINOSAD (LASER) T.C.7 GG**

**SPINOSAD (SPINTOR FLY): TALE FORMULATO VA UTILIZZATO CON TRATTAMENTI LOCALIZZATI (ESCA) T.C.7 GG**

**SI RICORDA CHE È AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA CONTRO TALE AVVERSITÀ.**

### *DROSOPHILA SUZUKII*

PER INTERVENTI SPECIFICI, INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM OPTI) (1 INT./ANNO) T.C. 7 GG**

**DELTAMETRINA (DECIS EVO ETC) T.C. 7 GG (CON PIRETROIDI MASSIMO 2 INT./ANNO)**

**SPINETORAM (DELEGATE WDG) T.C. 7 GG (MASSIMO 2 INT/ANNO)**



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### TICCHIOLATURA

LE CONDIZIONI CLIMATICHE SONO MOLTO FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI: IN PREVISIONE DI POSSIBILI PERTURBAZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI A BASE DI:

**\*FLUAZINAM (NANDO MAXI, ETC..)**

**DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)**

FRA CAPTANO E DITHIANON AL MASSIMO 14 INTERVENTI INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ.

**FLUOPYRAN+TEBUCONAZOLO (LUNA EXPERIENCE) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA') (ATTIVO ANCHE PER OIDIO)**

**PENTHIOPYRAD (FONTELIS) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')**

*\* EFFICACE ANCHE CONTRO ALTERNARIA*

PER INTERVENTI SUCCESSIVI ALLE PIOGGE INTERVENIRE ENTRO LE 72 ORE ED AGGIUNGERE UN PRODOTTO RETROATTIVO A BASE DI:

**IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)**

(TEBUCONAZOLO, DIFENOCONAZOLO, PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO-MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVYSION))



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### AFIDI

IN CASO DI PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI (AFIDE LANIGERO/GRIGIO), SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO**

OPPURE

**SULFOXAFLOX (CLOSER) IMPIEGABILE ENTRO IL 28 GIUGNO A SEGUITO DI DECRETO DI AUTORIZZAZIONE PER EMERGENZA FITOSANITARIA AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO**

OPPURE

**PIRIMICARB (PIRIMOR) AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO**

**FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO**

OPPURE

**SPIROTETRAMAT (MOVENTO) AL MASSIMO DUE INTERVENTO/ANNO**

### OIDIO

SULLE VARIETÀ SENSIBILI ED IN SITUAZIONI A MAGGIOR RISCHIO, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**ZOLFO (VARI)**

OPPURE

**BUPIRIMATE (NIMROD)**

SE POSSIBILE ASPORTARE E DISTRUGGERE I GETTI COLPITI

***ATTENZIONE: AL FINE DI SALVAGUARDARE L'AZIONE PRONUBA DELLE API, È VIETATO L'IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI CHE IN ETICHETTA RISULTINO DANNOSI/TOSSICI PER LE API.***

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

**In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.**