




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura  
Alessandria






CIA Alessandria

# COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

**BOLLETTINO N° 11**  
04/07/2024

## ANDAMENTO METEOROLOGICO







Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria





Coldiretti Alessandria




Confagricoltura  
Alessandria



CIA Alessandria

## PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI) CYDIA MOLESTA

Montemarzino



DA MODELLO PREVISIONALE PROSEGUE LA FASE LARVALE DELLA SECONDA GENERAZIONE CON L'INIZIO DEL 3° VOLO DEGLI ADULTI: IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C. 14 GG**  
**SPINETORAM (DELEGATE WDG) (MASSIMO UN INT./ANNO) T.C 7 GG**  
**ETOFENPROX (TREBON-SWORD UP)(MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG**  
**ACETAMIPRID (KESTREL) (DUE INT./ANNO) T.C. 14 GG**  
**SPINOSAD (LASER) (MASSIMO 3 INTERVENTI CON SPINOSINE)T.C. 7GG.**  
**BACILLUS THURINGENSIS (VARI)**

### MONILIA

PER LE VARIETÀ PROSSIME ALLA RACCOLTA, SI CONSIGLIA INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH A 0,6 KG/HA)**  
**CYPRODINIL (CHORUS)**

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ)

**\*TEBUCONAZOLO (FOLICUR)**

**\*DIFENOCONAZOLO (SCORE)**

**\*MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVISION) (AL MASSIMO DUE INTERVENTI) (\*HANNO ANCHE AZIONE ANTI-OIDICA)**

(AL MASSIMO DUE INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE TRA TEBUCONAZOLO E DIFENOCONAZOLO; I FUNGICIDI IBE MASSIMO 4 VOLTE ALL'ANNO)



Coldiretti Alessandria




Confagricoltura  
Alessandria



CIA Alessandria

## SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI) CYDIA FUNEBRANA

Montemarzino



DA MODELLO PROSEGUE L'OVIDEPOSIZIONE ED È INIZIATA LA NASCITA LARVALE: È POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV./ANNO) T.C. 7 GG.**

OPPURE

**SPINETORAM (DELEGATE WG) (UN INT./ANNO) T.C. 7 GG.**

OPPURE

**ACETAMIPRID (KESTREL) (DUE INT./ANNO) T.C. 15 GG.**

OPPURE

**DELTAMETRINA (VARI)(MASSIMO 3 INT/ANNO CON PIRETROIDI)**



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## ALBICOCCO (MATURAZIONE)

---

### MONILIA

PER LE VARIETÀ PROSSIME ALLA RACCOLTA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)  
(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)**

**FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**

**TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)  
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**

**MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVYSION) T.C. 3 GG. (MASSIMO 2  
INTERVENTI/ANNO)**

**PENTHIOPYRAD (FONTELIS) T.C. 3 GG.**

**(MASSIMO 1 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')**

**CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH)**

**CYPRODINIL (CHORUS)**

**(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')**

## CILIEGIO (INVAIATURA-MATURAZIONE)

---

### MONILIA

PER LE VARIETÀ PROSSIME ALLA RACCOLTA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVYSION) T.C.3 GG.(MASSIMO  
2INT/ANNO)**

**TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)  
(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)**

**FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**

**TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)  
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**

**PRESTARE ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA**



Coldiretti Alessandria



## CILIEGIO (INVAIATURA-MATURAZIONE)

---

### MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN **FASE DI INVAIATURA** (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

**ETOFENPROX\*** (TREBON, SWORD UP) T.C. 3 GG.

**ACETAMIPRID\*** (EPIK) T.C. 14 GG \*EFFICACI ANCHE CONTRO *DROSOPHILA*

**SPINOSAD** (LASER) T.C.7 GG

**SPINOSAD** (SPINTOR FLY): TALE FORMULATO VA UTILIZZATO CON TRATTAMENTI LOCALIZZATI (ESCA) T.C.7 GG

SI RICORDA CHE È AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA CONTRO TALE AVVERSITÀ.

### *DROSOPHILA SUZUKII*

L'ANDAMENTO CLIMATICO È PARTICOLARMENTE FAVOREVOLE ALLO SVILUPPO DELL'INSETTO: SI RICORDA CHE LA COLTURA È SUSCETTIBILE DALLA FASE DI INVAIATURA DEL FRUTTO E NELLE FASI DI PIENA MATURAZIONE COMMERCIALE.

PER INTERVENTI SPECIFICI, INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**EMAMECTINA BENZOATO** (AFFIRM OPTI) (1 INT./ANNO) T.C. 7 GG

**DELTAMETRINA** (DECIS EVO ETC) T.C. 7 GG (CON PIRETROIDI MASSIMO 2 INT./ANNO)

**SPINETORAM** (DELEGATE WDG) T.C. 7 GG (MASSIMO 2 INT/ANNO)



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura  
Alessandria




CIA Alessandria

## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

### CARPOCAPSA

Montemarzino



PROSEGUE LA FASE LARVALE DELLA SECONDA GENERAZIONE: SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE DALLA PROSSIMA SETTIMANA CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM)** (2 INT./ANNO) 7 GG

OPPURE

**SPINETORAM (DELEGATE WDG)** (MASSIMO 1 INT./ANNO) T.C. 7GG

OPPURE

**ACETAMIPRID (EPIK)** (DUE INT./ANNO) T.C. 14 GG.



Coldiretti Alessandria



## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### TICCHIOLATURA

IN PRESENZA DI INFEZIONI IN ATTO, IN PREVISIONE DI PRECIPITAZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI A BASE DI:

**\*FLUAZINAM (NANDO MAXI, ETC)(MASSIMO 4 INTERVENTI) T.C. 63 GG**

**DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)**

**DODINA (SILLYT, ETC.) (MASSIMO 2 INTERVENTI) T.C 40 GG.**

**SALI DI RAME**

**ZOLFO**

FRA CAPTANO E DITHIANON AL MASSIMO 14 INTERVENTI INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ.

*\* EFFICACE ANCHE CONTRO ALTERNARIA*

### AFIDI

IN CASO DI PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI (AFIDE LANIGERO/GRIGIO), SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO**

OPPURE

**SULFOXAFLOX (CLOSER) IMPIEGABILE ENTRO IL 28 GIUGNO A SEGUITO DI DECRETO DI AUTORIZZAZIONE PER EMERGENZA FITOSANITARIA AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO**

OPPURE

**PIRIMICARB (PIRIMOR) AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO**

**FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO**

OPPURE

**SPIROTETRAMAT (MOVENTO) AL MASSIMO DUE INTERVENTO/ANNO**



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### OIDIO

SULLE VARIETÀ SENSIBILI ED IN SITUAZIONI A MAGGIOR RISCHIO, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ZOLFO (VARI)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)

SE POSSIBILE ASPORTARE E DISTRUGGERE I GETTI COLPITI

***ATTENZIONE: AL FINE DI SALVAGUARDARE L'AZIONE PRONUBA DELLE API, È VIETATO L'IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI CHE IN ETICHETTA RISULTINO DANNOSI/TOSSICI PER LE API.***

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

**In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.**